



Carta de las formaciones dominantes del piso basal del valle del río de las Cuevas en relación con las geformas y los tipos de sitios, Mendoza, Argentina (Tramo Horcones - Punta de Vacas)

0 1875 3750 metros
1 : 25.000

Autor: Moira Alessandro de Rodríguez
Año: 2003
Base topográfica: Fotografías aéreas 1:50.000. Año 1966
Cartografía digital: Pablo Rizzo
Departamento de Geografía. FFyL.
Universidad Nacional de Cuyo

Situación de la Carta

- A- FORMACIONES AZONALES DOMINANTES**
- I- DE LAS LADERAS DE UMBRÍA**
- Formaciones arbustivas de *Adesmia pinifolia* con estrato subarborescente de *Adesmia aegiceras* (1.a) + *Adesmia pinifolia* con *Convolvulus arvensis* (1.b), en los Conos aluviales (1.a), (en menor proporción: *Ephedra chilensis* con *Tetraglochin alatum* (3); *Tetraglochin alatum* con *Adesmia aegiceras* (4.e) y *Adesmia pinifolia* con *Convolvulus arvensis* (1.b)).
 - Formaciones arbustivas de *Tetraglochin alatum* con estrato herbáceo de *Poa holciformis* (4.f) + herbáceas de *Poa holciformis* con *Stipa chrysophylla* (6.g) + *Poa holciformis* con *Phacelia secunda* y *Acaena sericea* (6.h), en los Conos de escombros, (en menor proporción: *Adesmia pinifolia* con *Convolvulus arvensis* (1.b); *Adesmia pinifolia* con *Adesmia aegiceras* (1.a); *Berberis empetrifolia* con *Tetraglochin alatum* (2.c); *Berberis empetrifolia* con *Poa holciformis* (2.d); *Tetraglochin alatum* con *Adesmia aegiceras* (4.e); *Adesmia aegiceras* con *Convolvulus arvensis* (7.i); *Convolvulus arvensis* con *Bromus macranthus* (8.j)).
 - Formaciones subarborescentes de *Adesmia aegiceras* con *Convolvulus arvensis* (7.j) + *Adesmia aegiceras* con *Stipa chrysophylla* (7.k), en las Morenas laterales, (en menor proporción: *Tetraglochin alatum* con *Adesmia aegiceras* (4.e); *Adesmia pinifolia* con *Adesmia aegiceras* (1.a); *Convolvulus arvensis* con *Bromus macranthus* (8.j)).
- II- DE LAS LADERAS DE SOLANA**
- Formaciones arbustivas de *Adesmia pinifolia* con estrato subarborescente de *Adesmia aegiceras* (1.a) + *Adesmia pinifolia* con *Convolvulus arvensis* (1.b), en los Conos aluviales, (en menor proporción: *Ephedra chilensis* con *Tetraglochin alatum* (2.c) y *Tetraglochin alatum* con *Adesmia aegiceras* (4.e)).
 - Formaciones arbustivas de *Tetraglochin alatum* con estrato herbáceo de *Poa holciformis* (4.f) en los Conos de escombros, (en menor proporción: *Gymnophyton polycephalum* (5) y *Berberis empetrifolia* con *Tetraglochin alatum* (2.c)).
 - Formaciones arbustivas de *Adesmia pinifolia* con estrato herbáceo de *Convolvulus arvensis* (1.b) en las Morenas laterales.
- III- DE LOS TALUDES RIBEREÑOS Y DE LA MORENA FRONTAL**
- Formaciones arbustivas de *Adesmia pinifolia* con estrato herbáceo de *Convolvulus arvensis* (1.b).
- IV- DEL FONDO DEL VALLE**
- Formaciones herbáceas de *Convolvulus arvensis* con *Poa holciformis* (8.k) + *Convolvulus arvensis* con *Bromus macranthus* (8.l), en la Morena de fondo, (en menor proporción: *Adesmia aegiceras* con *Convolvulus arvensis* (7.i); *Adesmia aegiceras* con *Stipa chrysophylla*, *Acaena sericea* y *Phacelia secunda* (7.j); *Adesmia pinifolia* con *Convolvulus arvensis* (1.b); *Tetraglochin alatum* con *Adesmia aegiceras* (4.e); *Ephedra chilensis* con *Tetraglochin alatum* (3) y *Berberis empetrifolia* con *Poa holciformis* (2.d)).
 - Formaciones subarborescentes de *Adesmia aegiceras* con estrato herbáceo de *Convolvulus arvensis* (7.i), en la Morena reciente (en menor proporción: *Adesmia aegiceras* con *Stipa chrysophylla*, *Phacelia secunda* y *Acaena sericea* (7.j); *Convolvulus arvensis* con *Bromus macranthus* (8.i); *Berberis empetrifolia* con *Poa holciformis* (2.d)).
- V- DE UMBRÍA, SOLANA Y FONDO DEL VALLE**
- Formaciones herbáceas hidrófilas de *Acaena splendens* con *Juncus acutus* (10.m) + *Acaena splendens* con *Poa annua* (10.n) (en menor proporción: *Juncus lescurii* (9); *Poa annua* con *Eleocharis abibracteata* (11) y con *Acaena splendens* (10.o) pura..

GEOFORMAS Y EXPOSICIÓN

A	MORENA RECIENTE
B	MORENA DE FONDO
C	MORENA FRONTAL
D	MORENAS LATERALES (umbría)
E	MORENAS LATERALES (solana)
F	CONOS ALUVIALES (umbría)
G	CONOS ALUVIALES (solana)
H	BASE DE CONOS DE ESCOMBROS (u)
I	BASE DE CONOS DE ESCOMBROS (s)
J	TALUDES RIBEREÑOS

REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS

—	Cota 3.500 mts
—	Transectas
—	Ruta Nacional n°7
—	Cursos de agua permanentes
—	Cursos de agua temporarios
—	Laguna
—	Vegas
—	Deterioro Antrópico
—	Sin vegetación

